

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒、口臭除去に 口腔内殺菌消毒薬

# イソジン® うがい薬

イソジンうがい薬は、有効成分ポビドンヨードを含むうがい薬です。  
口中からのどにすぐれた殺菌・消毒効果があります。

特  
徴

- 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- イソジンうがい薬は、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内およびのどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を示します。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)  
次の人は使用しないでください  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (2) 次の症状のある人  
□内のひどいだけ
- (3) 次の診断を受けた人  
甲状腺機能障害

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感	その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

## 効能・効果

口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄，口臭の除去

## 用法・用量

1回，本剤2～4mLを水約60mLにうすめて，1日数回うがいしてください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤はうがい用のみに使用し，キズややけどへの使用や，内服はしないでください。
- 目に入らないようご注意ください。万一，目に入った場合には，すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお，症状が重い場合には，眼科医の診療を受けてください。
- 本剤は使用するときにはうすめて，早めに使用してください。

## 成分・分量

1mL中 ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)  
添加物として エタノール，*l*-メントール，サッカリンナトリウム，香料を含有しています。

### 〈成分・分量に関連する注意〉

- 本剤の使用により，銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4)衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。  
なお，付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)使用期限をすぎた製品は，使用しないでください。

## 〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店，  
または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社【医薬情報センター】

電話：[大阪] 06-6209-6948 受付時間：9時～17時(土，日，祝日を除く)  
[東京] 03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)