


第2類医薬品

販売名:ピタセキトローチ
 特徴 ●口腔内殺菌成分・セ
 チルピリジニウム塩化物水
 和物を配合しており、のどの
 炎症によるのどの痛み・は
 れを抑えます ●鎮痛成分
 フェノールフタリジン酸ナキ
 ストロメトファンが咳中枢
 にはたらくて、つらい咳を抑
 えます。



使用に際してはこの説明書
 きをよく読み、本剤とともに
 保管してください。

【保管及び取扱い上の注意】
 (1)直射日光の当たらない涼しい
 少ない涼しい所に保管すること。
 (2)小児の手が届かない所に保管
 すること。(3)他の容器に入れ替
 えないこと(誤用の原因になっ
 たり品質が変わる)。(4)アルミ箔
 封はすみやかに使用すること。
 (5)使用期限を過ぎた製品は使用
 しないこと。

▲使用上の注意

☒してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1.次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2.本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと 他の鎮痛去痰薬、かぜ薬、鎮静
 薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(肺炎用内服薬、果物酔い薬、アレルギー用薬等)

▲相談すること
 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー
 症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱
 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明
 書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

▲症状の名称 症状
 ショック 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、
 (アナフィラキシー) 息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
 3.5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師
 又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み、のどのはれ、のどのあれ、のどの不快感、声がれ
【用法・用量】次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人(15歳以上)	1個	6回	2時間以上
15歳未満			使用しないこと。

<用法・用量に関連する注意>(1)定められた用法・用量を厳守すること。(2)かんだら、のみこんだりしないこと。
【成分】6個(1日使用量)中

成分	含量
フェノールフタリジン酸ナキストロメトファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物:ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、
 マクロゴール、トメントール、タンニン酸、D-ソルビトール、
 サッカリンNa、シロップ酸エステル、スクラロース、銅クロ
 ロフィリンNa、香料



製造販売元
大鵬薬品工業株式会社
 東京都千代田区神田錦町1-27
 お客様相談室 TEL.0120-4527-66
 https://www.taiho.co.jp/

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931 S210403



大鵬薬品 **PITAS**

話しながら使える
 貼り付くトローチ



販売名:
 ピタセキトローチ
第2類医薬品

12個入り

PITAS