

服用前にこの添付文書を必ずお読み下さい。また、大切に保管して下さい。

鼻炎用内服薬

くしゃみ、鼻みず、鼻づまりに

第2類医薬品

## 新エスペナン鼻炎カプセル

新エスペナン鼻炎カプセルは、5種類の有効成分により、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎によっておこるくしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、頭重等の症状を緩和します。

### ⚠ 使用上の注意

#### ☒ 【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい  
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい  
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないで下さい

#### 👤 【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊娠又は妊娠していると思われる人。
  - (3)授乳中の人は。
  - (4)高齢者。
  - (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (6)次の症状のある人。  
高熱、排尿困難
  - (7)次の診断を受けた人。  
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい  
口のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

## 【効能効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

## 【用法用量】

次の量を毎食後に水又はぬるま湯で服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1カプセル	3回
15才未満	服用しないこと	×

### ＜用法用量に関する注意＞

- (1) 用法用量を厳守して下さい。
- (2) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



## 【成分分量】

3カプセル(成人1日量)中

成 分	分 量	はたらき
クロルフェニラミンマレイン酸塩	9mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をしめます。(抗ヒスタミン作用)
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	70mg	鼻粘膜の充血、はれをおさえて、鼻づまりをやわらげます。(血管収縮作用)
ベラドンナ総アルカロイド	0.45mg	分泌抑制作用により、鼻みずをおさえ、なみだ目を改善します。(抗分泌作用)
グリチルリチン酸二カリウム	36mg	炎症をおさえ、鼻炎の症状を緩和します。(抗炎症作用)
無水カフェイン	150mg	頭重をやわらげます。(頭重緩和作用)

添加物として内容物にセルロース、ステアリン酸Mg、カプセルに酸化チタン、マクロゴール、ラウリル硫酸Na、ゼラチンを含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

### ■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室  
電話:(0748)88-3180(大代表)  
受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

発 売 元



白石薬品株式会社

大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元



滋賀県製薬株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町瀧879