

2012年10月

(記載要領変更に伴う改訂)
漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ツムラの漢方製剤 ツムラ漢方トローチ桔梗湯

「ツムラ漢方トローチ桔梗湯」は、漢方処方である「桔梗湯」から抽出したエキスより製した服用しやすいトローチ剤です。

こんな症状に効果があります

・のどがはれて痛む、扁桃炎、扁桃周囲炎。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
 - むくみ
 - 次の診断を受けた人。
 - 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

● 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきができるものの次の諸症：
扁桃炎、扁桃周囲炎

● 用法・用量

次の量を、食間または食前に、1個ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2個	3回
5歳以上15歳未満	1個	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。

〈トローチ剤の取り出し方〉

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、アルミ片を除いて取り出してから服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



● 成分・分量

本品6個(6600mg)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス625mgを含有します。

日局カンゾウ……………1.5g 日局キキョウ……………1.0g

添加物として日局ステアリン酸カルシウム、日局精製白糖、日局ヒドロキシプロピルセルロース、アラビアガム、エリスリトール、ケイ酸カルシウム、デキストリン、粉末還元麦芽糖水アメ、香料を含有します。

● 保管および取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少トローチ剤の色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、お買求めのお店または下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

製造販売元



お客様相談窓口
電話 0120-329-930
受付時間 9:00~17:30(土、日、夜間除く)
<http://www.tsumura.co.jp/>