

複合胃腸薬

食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけに

パンジアス顆粒

消化酵素・健胃生薬配合

すっきりしたのみごとの顆粒タイプ。消化酵素と健胃生薬（淡褐色の顆粒）に制酸剤（白色の顆粒）を配合し、消化を助け、弱った胃腸の働きを高めます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。
腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、毎食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	
11歳以上15歳未満	2/3包	
8歳以上11歳未満	1/2包	
5歳以上8歳未満	1/3包	
5歳未満	服用しないでください	×



〔用法・用量に関する注意〕

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

[成分・分量]

パンジアス顆粒は大人1日量3包（1包：1200mg）中に次の成分を含んでいます。

	成 分	3包中	働 き
消化薬	ビオチアスターゼ1000 プロザイム	90mg 18mg	デンプン、タンパク質の消化を助けます。
健胃生薬	ホミカエキス散 (ホミカエキス センブリ末 レーメントール)	200mg (20mg) 10mg 20mg	苦味、芳香健胃生薬により、唾液や胃液の分泌が促進され、弱った胃腸をととのえます。 のみごこちはすつきり。
制酸薬	炭酸水素ナトリウム 炭酸マグネシウム	1500mg 440mg	胃酸を中和します。

添加物として、デキストリン、パレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン及び乳糖を含有します。

[保管及び取扱い上の注意]

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、
2日以内に服用してください。

(5)使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



胃は健康のバロメータです。

ストレスや不規則な食事
でいつも胃の調子が悪く、
食欲がない。

ちょっと胃がもたれてむ
かついたり食が進まなかつ
たりする。

ふだんあまり胃が丈夫で
なくいつも胃が気になる。



このような方は本剤を服用されるほか、日常生活でも次の点にご注意ください。

暴飲暴食に気をつけましょ
う。

上手なストレス解消法を見
つけましょう。



お問い合わせ先

ティカ製薬株式会社 お客様相談係

電話番号：076(431)8863

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

発売元

白石薬品株式会社

〒567-0005 大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元

ティカ製薬株式会社

〒930-0982 富山県富山市荒川1丁目3番27号

NP12-05
B