

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

きりきず・すりきずに

第2類医薬品

マンダム

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

切傷、すり傷、かき傷、靴ずれ、そり傷

用法・用量

適量を患部に塗布又は塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

成分・分量とはたらき

淡い黄色の軟膏剤で、1g中に次の成分を含有しています。

成 分	分量(1g中)	はたらき
サリチル酸メチル	20mg	消炎鎮痛作用により、はれ・痛みをおさえます。
dl-カンフル	30mg	清涼感があり、おだやかな刺激と軽い麻痺作用で、傷口のかゆみ・痛みを和らげます。
l-メントール	15mg	
クロルヘキシジン塩酸塩	2mg	殺菌作用があり、皮膚を清潔に保ちます。

添加物として、ワセリン、セレシン、黄色4号(タートラジン)を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土曜、日曜、祝日を除く)

TEL. 0744-22-2440 FAX. 0744-22-2406

発 売 元

白石薬品株式会社

大阪府茨木市五日市1丁目10番33号

製造販売元

株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地