

開け口

第2類医薬品

販売名
ウルノHPクリーム

第2類
医薬品

特徴

へパリン類似物質 0.3%配合

保湿作用・抗炎症作用・血行促進作用があります。

油性クリーム（W/O型）

肌にしっかり密着し、外部の刺激から患部を守ります。

赤ちゃんから使えます

無香料・無着色でステロイドやエタノールは入っていません。

外部刺激をブロック
ウルノHPクリーム

へパリン類似物質

**高い水分保持力でしっかり保湿
水分を逃がしません**

表皮

(イメージ図)

肌には本来バリア機能があり、水分の蒸発や外部からの刺激をブロックし、からだを守っています。一方、皮膚が乾燥した状態（バリア機能が低下した状態）になると、水分が逃げやすく、外部からの刺激に弱い状態になってしまいます。ウルノHPクリームは、肌本来のバリア機能を高め、肌の潤いを取り戻します。

- ・出血のある傷口には使用しないでください。（血が止まりにくくなる場合があります。）
- ・顔面のきず・やけどのあとには使用しないでください。
- ・かさぶたには使用しないでください。

発売元 **テイカ製薬株式会社**
富山県富山市荒川一丁目3番27号

問い合わせ先 **新生薬品株式会社**
電話 (076) 472-0361
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新生薬品株式会社**
富山県中新川郡上市町横越16番1

効能・効果

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つぶり（顔面を除く）、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量

1日1～数回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのばして貼ってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

成分・分量 100g中

へパリン類似物質……………0.3g
添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、オクチルデカノール、ジメチルポリシロキサン、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、パルミチン酸デキストリン、1,3-ブチレングリコール、濃グリセリン、硫酸マグネシウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、精製水を含みます。

保管及び取扱い上の注意

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 4.使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

乾燥肌の保湿・改善に ウルノHPクリーム

ご使用に際して、この箱の説明書きを必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

× してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。
 - (1)出血性血液疾患（血友病、血小板減少症、紫斑病など）の人
 - (2)わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人（血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります）
2. 次の部位には使用しないでください。

目、粘膜（口腔、鼻腔、膣など）

⚠ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。



SNO