



肌を治すチカラ  
**muhi**

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

鎮痒消炎剤

すばやく浸透、しっかり治療


# 液体ムヒS<sup>2a</sup>

販売名：液体ムヒS2a

## この製品の特長

液体ムヒS2aは、

- 「かゆみ」にすばやく、「はれ・赤み」にしっかり効きます。  
これらの症状を引き起こすメカニズムは、それぞれ違います。  
液体ムヒS2aには、各々のメカニズムに作用する異なる2つの有効成分が配合されています。



- サラッとして使用感の良い液体です。
  - ・シャープな清涼感が得られます。
  - ・さわやかなハーブ系の香りですので、周囲を気にせず使用できます。



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
  - (1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
  - (2)創傷面、目の周囲、粘膜等。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください(目安として顔面で2週間以内、その他の部位で4週間以内)

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
  - (4)患部が広範囲の人。
  - (5)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
皮 膚 (患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、 持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


## 効 能

かゆみ、虫さされ、皮膚炎、かぶれ、じんましん、しっしん、しもやけ、あせも

## 用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 容器の使用方法



○同じ部位に他の軟膏・クリーム剤を併用するとスポンジを傷めることがあります。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後6カ月以上です。
- (2)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合(充血や痛みが持続したり、涙が止まらない場合等)には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)本剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

## 成分とそのはたらき

有効成分(100mL中)

成 分	分 量	は た ら き
デキサメタゾン酢酸エステル	25mg	かゆみ、はれ・赤みのもとになる炎症をおさえるステロイド成分です。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.0g	かゆみをおさえます。
l-メントール	3.5g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
dl-カンフル	1.0g	清涼感を与え、かゆみをしずめます。
グリチルレチン酸	0.2g	生薬由来成分で、かぶれなどの炎症をしずめます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	殺菌作用があります。

添加物としてBHT、クエン酸、クエン酸Na、エタノールを含有します。

### <液体ムヒS2aに配合されているステロイド成分について>

虫さされ、かゆみの治療には、かゆみをすみやかにしかもしっかりおさえ、掻きこわし等による悪化を防ぐことが重要です。ステロイド成分は、虫さされ等によるアレルギー性の炎症をおさえますので、主にかゆみの長期化と悪化の回避に有効にはたります。特に、ダニやノミなどによるかゆみには、ステロイド成分が適しています。

ステロイド成分による副作用は、皮膚が薄い顔や首等にあられやすく、顔の場合は、お酒を飲んだ時のように赤ら顔になることがあります。これらは、主に長期継続使用した場合に発生します。液体ムヒS2aに配合されているデキサメタゾン酢酸エステルは、作用緩和なステロイド成分ですので、虫さされ等小さな患部に短期間使用する場合には副作用はほとんどありません。同じ部位に継続して使う場合は、顔には2週間以内、その他の部位は4週間以内を目安にしてください。

早めに使って早めに治すことが、ステロイド成分配合剤の上手な使い方です。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)液がたれないように注意して使用してください。
- (6)次の物には付着しないように注意してください。(変質する場合があります。)  
床や家具などの塗装面、メガネ、時計、アクセサリー類、プラスチック類、化繊製品、皮革製品等。
- (7)使用期限(ケース底面及び容器底面に西暦年と月を記載)をすぎた製品は使用しないでください。  
使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
- (8)液もれを防ぐためキャップをしっかり閉めてください。

お客様相談窓口：株式会社 池田模範堂 〒930-0394 富山県中新川郡上市町神田16番地  
☎ 076-472-0911 (電話受付時間：月～金(祝日を除く) 9:00～17:00)