




フェルピナクが
患部に直接浸透!



リフェンダローション
有効成分

フェルピナク
3%配合
肩・腰・関節
の痛みに!



の痛みに!



80mL 第2類医薬品

【使用上の注意】

※ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります】

1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) 化膿している患部。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症状 |
|------|--------------------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれなど |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------------|--|
| ショック(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |

3. 1週間くらい使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

リフェンダローション
第2類医薬品

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読むよう大切に保管してください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 揮発性がありますので、使用後はキャップをしっかり締めてください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり、品質が変わります。)
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具等の塗装面などに付着すると変質又は変色する場合がありますので、付着しないように注意してください。
- (7) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。また、開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。

副作用被害救済制度の問い合わせ先(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号
使用期限



製造販売元
株式会社 タカミツ
名古屋市中区上飯田東町4の68の1

本剤についてのお問い合わせは、下記をお願いします。
株式会社 タカミツ
電話0120-459533(フリーダイヤル)
受付時間
(月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く))

火気厳禁
第二石油類



【特徴】

優れた鎮痛・消炎効果をあらわす
「フェルピナク」を主成分として3%配合!

- 肩・腰・関節などの痛み優れた効き目を発揮する鎮痛・消炎ローションです。
- 有効成分フェルピナクが患部に直接浸透し、痛みに関係する物質(プロスタグランジン)の発生を抑えます。
- L-メントール3%配合、スッキリとした爽快感です。
- 首の曲がっているボトル使用で、塗りにくかった患部にも上手に塗布できます。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)

【用法・用量】

- 1日2～4回、適量を患部に塗布してください。
<用法・用量に関連する注意>
- (1) 定められた用法を守ってください。
 - (2) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
 - (3) 外用のみに使用してください。
 - (4) 薬剤塗布後の患部をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分・分量】(100g中)

| 成分 | 含量 | 作用 |
|---------|------|-----------------|
| フェルピナク | 3.0g | 炎症を抑え、痛みを和らげる。 |
| L-メントール | 3.0g | 清涼感を与え、痛みを和らげる。 |

添加物として、トリエタノールアミン、ベンジルアルコール、1,3-ブチレンジグリコール、アルコール、エトド酸Na、グリセリン

容器を立てて保管してください



1234
5678