

第2類医薬品

葛根湯

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み



有効成分そのまま！

飲みやすくしました
(1包あたり3g+2g)

一歳の子供から大人まで服用できる

エキス顆粒

葛根湯

満量処方

セルファタケーション
税 除 封 装

21包

第2類医薬品

眠くなる成分は入っていません

感冒の初期、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

満量処方

日本薬局方 葛根湯エキス
の生薬量最大の25g処方
の生薬から抽出して得られた
エキスを全量配合した顆粒剤

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 湿気などにより薬が固化する場合がありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565
(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

【販売名】 漢方製剤 阪本漢法の葛根湯エキス顆粒 第2類医薬品

【効能・効果】 体力中等度以上のもの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 体力中等度以上のもの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※食間とは食後 2～3 時間を指します。 ※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】 成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 葛根湯エキス 4.34g

成分	分量	成分	分量
日局 カクコン	8g	日局 シヤクヤク	3g
日局 マオウ	4g	日局 カンゾウ	2g
日局 タイソウ	4g	日局 ショウキョウ	1g
日局 ケイヒ	3g		

※添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水クレー、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押し開ける

△使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の人は服用しないこと 生後3か月未満の乳児

☒ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - 胃腸の弱い人
 - 発汗傾向の著しい人
 - 高齢者
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人：むくみ、歩行困難
 - 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重要な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくなる見込みがない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



製造番号
使用期限

